

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: AMINOMAX 15

FUNCION: Aminoácidos enriquecidos con K, Ca y Zn

FABRICANTE: GreenCorp Biorganiks de México, S.A. de C.V., Blvd. Luis Donaldo Colosio 1858, Col. San Patricio. C.P. 25204. Saltillo, Coah. Tel: (844) 439-00-48 al 50. ventas@greencorp.com.mx

COMPOSICION QUIMICA: Potasio: 10.00%; Calcio: 5.00%; Zinc: 4.00%; Boro: 1.00%; Agentes quelatantes y Aminoácidos: 15.50%; Acondicionadores y Polisacaridos: 2.00%; Diluyentes: 62.50%.

CARACTERISTICAS FISICO-QUÍMICAS: Densidad: 1.325 g/ml; pH: 5.00

FORMULACION: Líquido soluble.

PROPIEDADES Y MODO DE ACCION: **Aminomax 15** es un bioestimulante líquido concentrado, formulado a base de 15 aminoácidos. El producto está fortalecido con Potasio y Boro, así como calcio quelatado, para lograr un mayor aprovechamiento del producto, por las raíces y el follaje de las plantas. El balance de aminoácidos que contiene **Aminomax 15** está diseñado en forma tal, que resulta en una porción equilibrada y significativa del desarrollo del cultivo. El empleo de **Aminomax 15** contiene principalmente los siguientes aminoácidos: prolina y glicina relacionadas con el “amarre” de las flores en algunas especies; cisteína y metionina como aminoácidos azufrados para la integración y enlace de proteínas estructurales; serina, glutamato, fenilamina y triptófano ligados a la resistencia de la planta.

INSTRUCCIONES DE USO: Siempre calibre su equipo de aplicación y agítese antes de usarse.

DOSIS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Cultivo	Dosis de aplicación
Solanaceas (Chile, tomate, papa)	1-2 L/ha por aplicación
Cucurbitáceas (Melon, pepino, sandia, calabacita)	1-2 L/ha por aplicación
Hortalizas en general (brócoli, coliflor, ajo, cebolla, etc.)	1-2 L/ha por aplicación
Papaya	2 L/ha por aplicación cada 15 días
Banano y mango	2 L/ha una vez por mes
Frutales caducifolios	2 L/ha a la brotación y desarrollo inicial.
Maíz, sorgo, avena, arroz, trigo y granos y cereales en general	1-2 L/ha por aplicación.

FICHA TÉCNICA

METODO PARA APLICAR EL PRODUCTO: Antes de abrir el envase, agite perfectamente **AminoMax 15**, abra con cuidado el envase, mida la cantidad indicada y viértala en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación. Se recomienda aplicar **AminoMax 15** en agua suficiente para cubrir el follaje a punto de goteo. Aplicación foliar.

INCOMPATIBILIDAD: **Aminomax 15** es compatible con la mayoría de los agroquímicos; sin embargo, se recomienda realizar una prueba antes de hacer la mezcla final.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Almacene el producto en lugares frescos y cubiertos, no se deje al alcance de los niños ni se ponga en contacto con animales o alimentos.

TOXICIDAD: **Aminomax 15** no es fitotóxico a las concentraciones, etapas y formas de aplicación recomendadas. El producto es considerado ligeramente tóxico, para humanos y animales. En caso de ingestión, provoque el vómito y consulte a su médico.

